




Baanbrekende voeding om de gezondheid van de schildklier te helpen verbeteren



Dierenartsen bevestigen in een klinische studie de werkzaamheid van y/d™

In een klinische studie hebben dierenartsen Prescription Diet™ y/d™ bij 221 katten in 10 Europese landen ingezet om de werkzaamheid van y/d™ te meten. De resultaten* waren uitstekend.

Beoordeling levenskwaliteit van de katten door dierenartsen**



- ✓ Bij de meerderheid van de katten waren de plasmaschildklierhormoonspiegels na 8 weken binnen het referentiebereik
- ✓ Ernst van de polyfagie, hyperactiviteit en andere symptomen nam af
- ✓ Algemene levenskwaliteit verbeterde in de loop van de studie

Specialisten verwelkomen de nieuwe voedingsoplossing:



Mijn eerste patiënt die y/d™ kreeg, was van een eigenaresse met een handicap die haar kat geen medicijnen kon geven. Het was ook heel moeilijk voor haar om naar de dierenartspraktijk te komen. De mogelijkheid van een aanpak via de voeding betekende voor deze kat zijn redding. Het is geweldig om in dit soort gevallen een voedingsbehandeling te kunnen bieden als alternatief.

Dr Sarah M.A. Caney BVSc PhD 'in Small Animal Medicine (Feline)', lid van het 'Royal College of Veterinary Surgeons', RCVS-specialist in kattengeneeskunde

Lees de mening van andere specialisten op www.hillsvet.nl of www.hillsvet.be

* Resultaten van klinische studie met Prescription Diet™ y/d™ in Europa gehouden, van januari tot juli 2012.

** Zoals geregistreerd op een ordinale gewone schaal. Weergegeven als gemiddelde. 0 wkn: n=221; 4 wkn: n=92; 8 wkn: n=73

Hill's™ Prescription Diet™ y/d™: Net zo gemakkelijk als voeden

Tips voor een succesvolle overschakeling van katten op y/d™

Informeer eigenaren over veranderingen in de eetlust

- Katten met hyperthyroïdie kunnen last hebben van polyfagie. Naarmate de schildklierfunctie verbetert, neemt de polyfagie af, wat een teken van herstel kan zijn.
- Katten met hyperthyroïdie kunnen ook lijden aan anorexie vanwege een gelijktijdig voorkomende ziekte, ouderdom, medicijnen, enz. We raden aan deze gevallen nauwlettend te volgen voor een goede overschakeling op het nieuwe voer.

Huishoudens met meerdere katten

- Voor huishoudens met meerdere katten raden we aan de gezonde en zieke dieren op verschillende tijden en plaatsen te voeren, en het voer op een veilige plaats te bewaren.
- Gezonde katten die y/d™ eten, moeten dagelijks minimaal 1 eetlepel van een onderhoudsvoer extra krijgen.



Binnen-/buitenkatten


- Het buitenleven kan de werkzaamheid beïnvloeden, dus we raden aan deze gevallen nauwlettend te volgen.

Bied verschillende soorten voeding aan

- Het combineren van y/d™ natvoer en droogvoer is bevorderlijk voor de therapietrouw.

Zorg voor een geleidelijke overschakeling

- We raden aan y/d™ geleidelijk te introduceren, over een periode van 7 dagen, zoals hieronder vermeld.
- Patiënten die anti-thyroïde geneesmiddelen gebruiken, dienen de medicatie volledig te staken voordat zij overschakelen op y/d™.



Na de overschakeling dient y/d™ als de enige voedingsbron te worden gebruikt

Brokken afgebeeld op ware grootte.
Kleur kan van de foto afwijken.



Clinical Nutrition to
Improve Quality of Life™